



LES FILS CRANTES

Le lifting médical par fils crantés (nommés aussi fils russes, surtout à ne pas confondre avec les « fils d'or ») est une technique légère et efficace qui traite le visage sur toute sa hauteur, de la bajoue jusqu'au sourcil.

Cette méthode est efficace avec d'excellents résultats dans des indications très précises, permettant en toute sécurité d'accéder au traitement de l'air fatigué des femmes jeunes ou à l'affaissement plus global des femmes plus âgées.

Devant une chute des tissus au niveau du visage, un lifting chirurgical n'est pas forcément nécessaire.

Dans le cas d'alterations débutantes, la technique des fils crantés représente une alternative élégante aux interventions chirurgicales beaucoup plus lourdes.

Il s'agit d'une procédure rapide, peu traumatique, sans cicatrices visibles, avec très peu d'éviction sociale (de quelques jours). Les suites sont incomparablement plus simples que pour un lifting chirurgical. En contrepartie, le résultat semble, a priori, moins stable, avec une durée qu'on peut estimer entre 2 et 5 ans environ.

Les fils crantés sont des fils chirurgicaux avec des petites accroches orientées de façon à s'ouvrir lorsqu'elles sont implantées dans la graisse sous-cutanée. Le tissu cutané est pris légèrement dans ces dents et est ensuite suspendu et relevé.

Docteur Vlad Negulescu

Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique

tél : 04.78.37.01.01

www.info-chirurgie-esthetique.fr

Diplôme Universitaire de Microchirurgie

Diplôme Universitaire de Chirurgie Plastique de la Face

Diplôme Universitaire de Réparation Juridique du Dommage Corporel

Membre du Collège de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique



Les zones traitées

Les modifications qui peuvent être traitées avec les fils crantés sont/

- la chute de la queue du sourcil et de l'angle externe de l'oeil,
- les bajoues et les pommettes affaissées,
- certains cas de relâchement cutané au niveau du cou.

La technique

La technique des fils crantés permet de relever les tissus et de les replacer aux endroits d'origine. L'intervention se déroule le plus souvent sous anesthésie locale.

Après les marquages précis, on infiltre la zone traitée en utilisant une aiguille hypodermique avec un mélange anesthésique et vasoconstricteur.

Successivement, les fils sont introduits sous la peau, à une profondeur précise et selon le tracé déterminé au préalable.

Les points d'entrée et de sortie du fil, ainsi que leur trajet sous la peau sont extrêmement importantes, et les limites de tolérance sont de l'ordre du millimètre.

Lorsque le placement souhaité est obtenu, on coupe les fils au niveau de la peau et on les insère sous la surface cutanée.

Les suites

Habituellement on note un gonflement et éventuellement des bleus modérés, qui se resorbent progressivement au bout de 5-15 jours. La zone sera légèrement endolorie, bouffie et peut-être colorée en raison du petit saignement habituel, lié à l'opération.

Le patient peut reprendre ses activités normales (marche légère, télévision, ordinateur...) dans l'heure mais il doit se reposer pendant les quelques jours qui

Docteur Vlad Negulescu

Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique

tél : 04.78.37.01.01

www.info-chirurgie-esthetique.fr

Diplôme Universitaire de Microchirurgie

Diplôme Universitaire de Chirurgie Plastique de la Face

Diplôme Universitaire de Réparation Juridique du Dommage Corporel

Membre du Collège de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique



suivent l'intervention. Ceci exclut les activités physiques ou sportives, la parole et les mimiques faciales excessives, le rasage, les gommages, les massages, les peelings chimiques, les nettoyants agressifs et la position de sommeil sur le visage pendant 7 à 15 jours. Ces recommandations visent à éviter tout déplacement des fils.

Les résultats

Il y a souvent des résultats immédiats. Cependant, ceux-ci continuent à s'améliorer pendant une période de 3 à 12 mois après l'intervention. Cette amélioration est due à la synthèse du collagène (il s'encapsule et se forme autour des fils) et à l'effet de lifting et de resserrement.

On peut estimer la stabilité des résultats entre 2 et 5 ans environ ; des évaluations plus précises sont actuellement à l'étude.

En conclusion, ce procédé de chirurgie esthétique s'adresse aux femmes comme aux hommes et ce à partir de 30 ans, lorsqu'on souhaite prévenir les effets de l'âge ou si les altérations du visage sont débutantes. L'objectif est de corriger le relâchement du visage, causé par une distension musculaire et cutanée.

* *

*

Tels sont les éléments d'information que nous souhaitons vous apporter en complément à la consultation.

Nous vous conseillons de conserver ce document, de le relire après la consultation et d'y réfléchir "à tête reposée".

Cette réflexion suscitera peut être de nouvelles questions, pour lesquelles vous attendrez des informations complémentaires.

Nous sommes à votre disposition pour en reparler au cours d'une prochaine consultation, ou bien par téléphone, voire le jour même de l'intervention, si vous le souhaitez.

Docteur Vlad Negulescu

Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique

tél : 04.78.37.01.01

www.info-chirurgie-esthetique.fr

Diplôme Universitaire de Microchirurgie

Diplôme Universitaire de Chirurgie Plastique de la Face

Diplôme Universitaire de Réparation Juridique du Dommage Corporel

Membre du Collège de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique